

Gwida għall-Ġenituri u l-Kuraturi: Affarijiet importanti x'tiftakar b'rabta mat-trattament b'Gilenya[®] (fingolimod) ▼


▼ Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta' malajr ta' informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata.

Xi tkun l-isklerożi multipla?

L-isklerożi multipla (MS) titqies bħala marda immunomedjata – x'aktarx awtoimmuni.

Is-sistema immuni tattakka l-kisja protettiva (imsejħha myelin) ta' madwar iċ-ċelluli nervużi fis-sistema nervuża ċentrali (CNS), magħmula mill-moħħ u s-sinla.

Isimha ġej mill-feriti li jirriżultaw mill-attakki infjammatorji mwettqa f'firxa ta' postijiet fis-CNS.




Kif jaħdem Gilenya?

Ma nafux għal kollox kif taħdem it-terapija b'Gilenya fuq l-MS.

Gilenya jeħel maċ-ċelluli l-bojod tad-demmm (il-limfoċiti) fid-demmm billi jinteraġixxi mal-proteini fil-wiċċ taċ-ċellula magħrufin bħala r-riċetturi tal-isfingosina 1-fosfat (S1P).

lċ-ċelluli l-bojod tad-demmm li jinteraġixxu ma' Gilenya jispiċċaw maqbudin fl-għeqiedi limfatiċi, li ma jħalluhomx jgħaddu għas-CNS u joħolqu infjammazzjoni u ħsara.



Kontraindikazzjonijiet u prekawzjonijiet



Gilenya (fingolimod) m'għandux jintuża minn pazjenti b'mard tal-qalb speċifiku, u mhuwiex irrakkomandat għal pazjenti li qed jieħdu wkoll mediċini magħrufin li jnaqqsu r-rata tat-taħbit tal-qalb.

Gilenya m'għandux jintuża minn nisa tqal u nisa li jistgħu joħorġu tqal (inkluż tfajliet adolexxenti) li mhumiex qed jużaw kontraċezzjoni effettiva.



It-tabib se jistaqsi lit-tifel, tifla jew adoloxxenti li tagħhom inti responsabbli sabiex jibqgħu fiċ-ċentru tas-saħħa jew klinika għal sitt sigħat jew aktar wara li jieħdu l-ewwel doża ħalli b'hekk ikunu jistgħu jittieħdu l-miżuri li jixirqu jekk iseħħu effetti sekondarji. Jaf ikun hemm ċirkustanzi fejn ikun meħtieġ li jinżammu hemm sal-għada.

Se jittieħdu prekawzjonijiet simili jekk id-doża tagħhom tiżdied minn 0.25 mg għal 0.5 mg darba kuljum.

Kontraindikazzjonijiet u prekawzjonijiet



Jekk inti l-ġenitur/il-kuratur ta' tfajla adolexxenti li tista' toħroġ tqila, se tingħata kartuna li tfakkar lill-pazjenti speċifikament dwar it-tqala.



Jekk jogħġbok aqra sew il-Fuljett ta' Tagħrif għall-Pazjent qabel ma t-tifel, tifla jew adolexxenti li tagħhom inti responsabbli jibdedw it-trattament b'Gilenya.



Jekk jogħġbok informa lit-tabib jekk it-tifel, tifla jew adolexxenti li tagħhom inti responsabbli, jew qarib tagħhom, għandhom storja ta' epilessija.



Ikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih jekk it-tifel, tifla jew adolexxenti li tagħhom inti responsabbli jgarrab xi reazzjonijiet mhux mixtieqa matul it-trattament b'Gilenya.

Għid lil kwalunkwe tabib li jara lit-tifel, tifla jew adolexxenti li qegħdin jieħdu Gilenya.

Qabel it-tnedija tat-trattament b'Gilenya



Tqala – Gilenya huwa teratoġeniku. Tfajliet adoloxxenti li jistgħu joħorġu tqal għandhom ikunu mgħarrfa mit-tabib tagħhom dwar ir-riskji serji li għandu Gilenya għall-fetu, u jrid ikollhom test tat-tqala negattiv (ivverifikat minn professjonist mill-qasam tal-kura tas-saħħa) qabel ma jinbeda t-trattament b'Gilenya.



Kanċer relatat mal-virus tal-papilloma umana (HPV) – It-tabib se jevalwa jekk it-tifel, tifla jew adoloxxenti li tagħhom inti responsabbli għandhomx bżonn jagħmlu screening għall-kanċer (inkluż test tal-Pap), u jekk għandhomx jitlaqqmu kontra l-HPV.

Qabel it-tnedija tat-trattament b'Gilenya



Funzjoni tal-fwied – Gilenya jista' jwassal għal riżultati mhux normali fit-testijiet tal-funzjoni tal-fwied. It-tifel, tifla jew adoloxxenti li tagħhom inti responsabbli se jkollhom bżonn jagħmlu test tad-demem qabel ma jinbeda t-trattament b'Gilenya bħala terapija.



Aċċessjonijiet – Matul it-trattament jistgħu jseħħu aċċessjonijiet. Għarraf lit-tabib jekk it-tifel, tifla jew adoloxxenti li tagħhom inti responsabbli, jew xi qarib tagħhom, għandu storja ta' epilessija.

L-ewwel darba li tiehu Gilenya



Rata baxxa tat-taħbit tal-qalb u taħbit tal-qalb irregolari –

Malli jinbeda t-trattament, Gilenya jwassal biex titbaxxa r-rata tat-taħbit tal-qalb. Dan jista' jwassal biex tħossok stordut jew titbaxxa l-pressjoni tad-demm. Jekk it-tifel, tifla jew adoloxxenti li tagħhom inti responsabbli jesperjenzaw sintomi bħal sturdament, dardir, mejt, jew palpitazzjonijiet jew iħossuhom skomdi wara li jieħdu l-ewwel doża ta' Gilenya, jekk jogħġbok għarraf minnufih lit-tabib tagħhom.

Qabel tittieħed l-ewwel doża, it-tifel, tifla jew adoloxxenti **se**:

- Ikollhom elettrokardjogramma (ECG) fil-linja bażi li jevalwa kif qed taħdem qalbhom
- Titkejlilhom il-pressjoni tad-demm
- Issirilhom evalwazzjoni tal-iżvilupp fiżiku
- Jittiħdulhom it-tul u l-piż

L-ewwel darba li tiehu Gilenya

Waqt is-sitt sigħat osservazzjoni:



- Se jiċċekkjawlek il-polz u l-pressjoni tad-demem kull siegħa
 - Matul dan il-ħin it-tifel, tifla jew adoloxxenti jaf jibqgħu taħt osservazzjoni permezz ta' ECG kontinwu
- ECG malli jgħaddu s-sitt sigħat



Ċempel lit-tabib tagħhom f'każ li jitwaqqaf it-trattament. Jekk it-tifel, tifla jew adoloxxenti waqqfu Gilenya għal ġurnata jew aktar matul l-ewwel ġimagħtejn mit-trattament, jew għal aktar minn sebat ijiem matul it-tielet u r-raba' ġimgħa mit-trattament, jew jekk Gilenya twaqqaf għal aktar minn ġimagħtejn wara li jkun ilu jingħata għal mill-inqas xahar, l-effett tal-bidu fuq ir-rata tat-taħbit tal-qalb jaf jerġa' jfeġġ. Meta terġa' titnieda t-terapija b'Gilenya, it-tabib jaf jiddeċiedi li jibqa' josserva r-riżultati tar-rata tat-taħbit tal-qalb u tal-pressjoni tal-qalb kull siegħa, li jagħmel ECGs, u jekk meħtieġ, li jżomm lit-tifel, tifla jew adoloxxenti għal aktar osservazzjoni sal-għada.

Waqt li qed tiehu Gilenya



Infezzjonijiet – Minħabba li Gilenya jaffettwa s-sistema immuni, hemm aktar ċans li t-tifel, tifla jew adoloxxenti jlaqqtu infezzjonijiet. Jekk taħseb li għandhom xi waħda minn dawn li ġejjin, matul it-trattament u sa xahrejn minn wara li jitwaqqaf, ċempel lit-tabib tagħhom minnufih:

infezzjoni, influwenza, uġiġħ ta' ras flimkien ma' ebusija f'għonqhom, sensitività għad-dawl, dardir u/jew konfużjoni (jafu jkunu sintomi ta' meningite).

Jekk taħseb li l-MS tagħhom sejra għall-agħar (eż. iħossuhom dgħajfin jew ikollhom tibdil fil-vista) jew jekk tinnota xi sintomi godda, kellem lit-tabib tagħhom minnufih. Dawn jafu jkunu s-sintomi ta' disturb rari fil-moħħ imsejjaħ lewkoenċefalopatija multifokali progressiva (PML), li tiġi minn infezzjoni.

Waqt li qed tiehu Gilenya



Kanċer tal-ġilda – Kienu rrapportati kanċers tal-ġilda f'pazjenti bi sklerozi multipla ttrattati b'Gilenya. Għarraf lit-tabib tagħhom minnufih jekk tinnota li t-tifel, tifla jew adoloxxenti għandhom xi boċoċ fil-ġilda (eż. boċoċ ileqqu donnhom perli), irqajja' jew feriti miftuħa li ma jfiqux fi żmien ffit ġimgħat. Sintomi ta' kanċer tal-ġilda jistgħu jinkludu tkabbir anormali jew tibdiliet fit-tessut tal-ġilda (eż. għazez mhux tas-soltu) b'tibdil fil-lewn, għamla jew daqs maż-żmien.



Funzjoni tal-fwied – Gilenya jista' jwassal għal riżultati anormali tat-testijiet tal-fwied. It-tifel, tifla jew adoloxxenti li tagħhom inti responsabbli se jkollhom bżonn test tad-demem fl-ewwel, it-tielet, is-sitt, id-disa', u t-tnax-il xahar waqt it-terapija b'Gilenya u wara b'mod regolari.

Waqt li qed tiehu Gilenya



Tqala –Tfajliet adoloxxenti li jistgħu joħorġu tqal **għandhom** isirulhom testijiet tat-tqala b'mod ripetut b'intervalli xierqa waqt li għaddejjin bit-trattament b'Gilenya.



Tfajliet adoloxxenti li tagħhom inti responsabbli **għandhom** jirċievu pariri ta' spiss bl-għajjnuna tal-kartuna li tfakkar lill-pazjenti speċifikament dwar it-tqala mingħand professjonist mill-qasam tal-kura tas-saħħa dwar ir-riskji serji għall-fetu minħabba Gilenya.



Tfajliet adolexxenti li tagħhom inti responsabbli **għandhom** jużaw kontraċezzjoni effettiva waqt li qed jieħdu Gilenya, u sa xahrejn minn wara li jitwaqqaf it-trattament minħabba r-riskji serji ta' Gilenya għall-fetu.



Irrapporta minnufih lit-tabib tagħhom kull tqala (bi ħsieb jew le) waqt li qed jieħdu t-trattament b'Gilenya u sa xahrejn minn wara li jitwaqqaf.

Noti:

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok irreferi għall-fuljett ta' tagħrif.

Reazzjonijiet avversi suspettati u żbalji bl-użu ta' prodotti mediċinali assoċjati mall-itehid ta' **Gilenya** għandom jiġu rraportati lill-:



Awtorita' Dwar il-Mediċini,
 Sir Temi Zammit Buildings,
 Malta Life Sciences Park,
 San Gwann SGN 3000.

Jew fuq: www.medicinesauthority.gov.mt/adrportal

Inkella lil: Novartis Pharma Services Inc. Representative Office Malta jew fuq numru tat-telefown +356 21222872.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irlanda.

Rappreżentant lokali għad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq: Novartis Pharma Services Inc., Representative Office Malta. Numru tat-telefown: +356 21222872.

Gilenya hu marka rreġistrata ta' Novartis Pharma AG.
 Novartis Pharma AG CH-4002 Basel, Switzerland
 ©2019 Novartis Pharma AG