

Dak li għandek tkun taf dwar LEMTRADA® (alemtuzumab)

Čempel lin-newrologu tiegħek mill-ewwel biex tirrapporta dawn is-sintomi irrispettivament jekk humiex ġodda, sejrin għall-agħar jew huma sintomi li reġġhu qed jidhru. Fittex attenzjoni medika jekk ma tistax taqbad it-tabib tiegħek, u ara li turihom din il-karta.

EFFETTI SEKONDARJI LI GħANDEK TOQGHOD ATTENT GħALIHOM:

Infezzjonijiet serji

Deni u/jew tkexkix ta' bard, għeja kbira, tħossok ħażin

Qtugħ ta' nifs, sogħla, tħarħir, uġigħ jew oppressjoni fis-sider jew sogħla bid-demm

Infezzjoni rari fil-moħħi imsejħha PML (*progressive multifocal leukoencephalopathy - lewkoenċefalopatija multifokali progressiva*)

- Djugħfija progressiva jew guffaġni tad-dirghajn u r-riglejn,
- Disturb tal-vista, diffikultajiet fid-diskors
- Bidliet fil-ħsieb, memorja, u orjentazzjoni li twassal għall-konfużjoni u bidliet fil-personalità

Effetti sekondarji serji li huma marbuta temporalment mal-infużjoni LEMTRADA

(effetti sekondarji li s-soltu jseħħu fi żmien 1-3 ijiem mill-infużjoni)

Attakk tal-qalb

- Uġigħ fis-sider jew skumdità, qtugħ ta' nifs, uġigħ jew skumdità fid-dirghajn, fix-xedaq, fl-għonq, fid-dahar jew fl-istonku
- Sturdament, dardir, traspirazzjoni

Puplesija u qtugħ fil-vini li jfornu lill-moħħi

- Telqa f'partijiet tal-wiċċi li titfaċċa f'daqqa, dīgħufija fuq naħha waħda, diffikultà fid-diskors
- Uġigħ ta' ras qawwi li jinhass f'daqqa, uġigħ fl-għonq

Fsada fil-pulmuni

- Qtugħ ta' nifs, uġigħ fis-sider jew skumdità, sogħla bid-demm

Tromboċitopenija

Tbenġil li jseħħu malajr u/jew fsada

Effetti sekondarji mdewma (li jistgħu jseħħu minn xhur sa snin wara l-infużjoni)

Disturbi tat-tirojde

- Traspirazzjoni eċċessiva, telf jew žieda ta' piż mhux spjegabbli, nefha tal-għajnejn, nervoziżmu, taħbit tal-qalb mgħaġġel

- Kesħa, għeja li tiggrava u kostipazzjoni li titfaċċa b'mod ġdid

Purpura tromboċitopenika immuni (*immune thrombocytopenic purpura - ITP*)

- Tikek żgħar mifruxa fuq il-ġilda li huma ħomor, roża jew vjola, tbenġil li jseħħi malajr, fsada minn qata' li tkun iktar diffiċli biex twaqqa mis-soltu, čikli mestrwali li jkunu itqal, itwal jew iktar frekwenti min-normal

- Fsada mill-ħanek jew l-imnieħher li hija ġdida jew iddu iktar mis-soltu biex tieqaf, sogħla bid-demm

- Ĝogi muġugħha jew minfuħin

Problemi fil-kliewi fosthom il-marda tal-Membrana tal-Baži Antiglomerulari (*anti-Glomerular Basement Membrane disease – marda anti-GBM*)

- Demm fl-awrina li jista' jkun aħmar jew kulur it-te, nefha f'rīglejk jew saqajk

Epatite awtoimmuni

- Dardir mhux spjegabbli, remettar, għeja kbira, uġiġi addominali, nuqqas ta' aptit, nefha addominali

- Ĝilda u għajnejn safranin u/jew awrina skura, fsada jew tbenġil li jseħħi ta' malajr iktar min-normal

Limfoistoċiċi emofagoċitika – (*Hemophagocytic lymphohistiocytosis - HLH*)

- Deni għoli mhux spjegabbli, uġiġi ta' ras qawwi, għonq ieħes, tkabbir tal-glandola linfatika, ġilda safranija, u raxx fil-ġilda

Emofilja miksuba

- Fsada minn qata' li ddum iktar mis-soltu biex tieqaf

- Tbenġil spontanju, fsada mill-imnieħher, ġogi muġugħha jew minfuħha

KARTA TA' TWISSIJA TAL-PAZJENT

Jekk jogħġebok ġorr din il-karta miegħek il-ħin kollu u uriha lill-fornituri kollha tas-servizzi tal-emerġenza u tal-kura tas-saħħha li huma involuti fil-kura tiegħek sabiex tinfurmahom dwar it-trattament bil-LEMTRADA.®

Jien ġejt trattat bil-LEMTRADA, trattament għall-isklerosi multipla (MS) li teffettwa s-sistema immunitarja. Jien qiegħed nipparteċipa f'programm speċjali ta' monitoraġġ li jkompli għal mill-inqas 48 xahar wara l-aħħar trattament tiegħi.

It-trattament LEMTRADA jista' jżid ir-riskju ta':

- Infezzjonijiet serji
- Effetti sekondarji serji li huma assoċjati temporalment mal-infuzjoni ta' LEMTRADA: attakk tal-qalb, puplesija, qtugħ fil-vini li jfornu lill-moħħ, fsada fil-pulmun, u trombocitopenija
- Effetti sekondarji mdewma: disturbi tat-tirojde, ITP, problemi fil-fwied, epatite awtoimmuni, HLH u emofilja miexsuba

Tobba

Ara LEMTRADA Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott (SmPC) għal iktar informazzjoni

In-newrologu tiegħi li qiegħed jikteb ir-riċetta tal-LEMTRADA jista' jiġi kkuntattjat bit-telefown jew bl-email permezz tad-dettalji ta' hawn taħt. Tobba jew professjonisti tal-kura tas-saħħha oħrajin involuti fil-kura tiegħi jistgħu jiġu elenkti wkoll.

Jekk issir xi evalwazzjoni medika, jekk jogħġibok ipprovd Kopji tar-rekords medici kollha, fosthom kull trattament u/jew riżultati tat-testijiet lit-tabib/tobba elenkti hawn taħt.

Isem tal-pazjent:

Firma tal-pazjent:

Data tal-aħħar infuzjoni tal-LEMTRADA

Isem	Numru tat-telefown	Email
------	--------------------	-------

Newrologu

Tabib tal-Mediċina Ģenerali

Infermiera tal-MS

Huwa importanti ħafna li int tkompli tagħmel it-testijiet tiegħek ta' kull xahar għall-inqas għal 48 xahar (4 snin) wara l-aħħar infuzjoni tiegħek (anke jekk qed tħossok tajjeb).

Effetti sekondarji mdewma jistgħu jseħħu wara 48 xahar. Għaldaqstant inti trid tkompli toqgħod attent għas-sinjal, anke wara li t-testijiet tiegħek ta' kull xahar ma jibqgħux meħtieġ aktar.

**Identifikazzjoni u dijanjosi
bikrija jistgħu jtuk l-aħjar**

**Int trid ukoll
tkompli toqgħod attent**

**Għamel dan għal mill-inqas
48 xahar wara l-aħħar kors tiegħek**

opportunità għat-titjib

għas-sinjal u s-sintomi

tat-trattament LEMTRADA
