



	<p>PT</p> <p>Cartão do doente</p> <p>WELIREG® ▼ (belzutifano)</p> <p>70121470/00-1/5331</p> <ul style="list-style-type: none"> Não tome WELIREG para a doença de von Hippel-Lindau se estiver grávida. Se está grávida e necessita tratamento para carcinoma de células renais (CCR), fale com o seu médico sobre a utilização de WELIREG. WELIREG pode prejudicar o bebé e pode causar aborto espontâneo. Se está grávida, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
	<p>EN</p> <p>Patient Card</p> <p>WELIREG® ▼ (belzutifan)</p>  <ul style="list-style-type: none"> Do not take WELIREG for von Hippel-Lindau disease if you are pregnant. If you are pregnant and need treatment for Renal Cell Carcinoma (RCC), talk to your doctor about the use of WELIREG. WELIREG may harm the baby and may cause a miscarriage. If you are pregnant, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

<ul style="list-style-type: none"> O seu médico irá pedir-lhe um teste de gravidez antes de começar a tomar WELIREG. Não deve engravidar enquanto estiver a tomar WELIREG. <p>Métodos anticoncecionais (contraceção)</p> <ul style="list-style-type: none"> Se é uma mulher que pode engravidar: <ul style="list-style-type: none"> Métodos contraceptivos com hormonas - tais como a pilula, injeções ou adesivos transdérmicos - podem não funcionar tão bem enquanto estiver a tomar WELIREG. Enquanto estiver a tomar WELIREG e durante pelo menos 1 semana após a última dose deverá: <ul style="list-style-type: none"> Utilizar um método anticoncepcional (contraceção) não hormonal eficaz ou Assegurar que o seu parceiro utiliza preservativo. 	<ul style="list-style-type: none"> Fale com o seu médico ou farmacêutico sobre quais os métodos contraceptivos adequados para si enquanto estiver a tomar WELIREG. Informe imediatamente o seu médico se ficar grávida ou pensar que pode ter ficado grávida durante o tratamento. <p>Para mais informações, consultar o Folheto Informativo de WELIREG que contém informação para o doente.</p> <p>Contactos importantes</p> <p>Nome do médico _____</p> <p>Contacto direto do hospital _____</p> <p>Telefone fora de horas _____</p> <p>O meu nome _____</p> 
<ul style="list-style-type: none"> Your doctor will do a pregnancy test before you start taking WELIREG. You should not become pregnant while taking WELIREG. <p>Birth control (contraception)</p> <ul style="list-style-type: none"> If you are a woman who could get pregnant: <ul style="list-style-type: none"> Birth control methods that contain hormones-such as birth control pills, injections, or transdermal patches-may not work as well while you are taking WELIREG. While you are taking WELIREG and for at least 1 week after your last dose you should: <ul style="list-style-type: none"> Use an effective form of non-hormonal birth control (contraception) or Have your male partner use a condom. Talk to your doctor or pharmacist about birth control methods that may be right for you while you are taking WELIREG. 	<ul style="list-style-type: none"> Tell your doctor immediately if you become pregnant or think you might have become pregnant during treatment. <p>For more information, consult the Package Leaflet for WELIREG containing information for the patient.</p> <p>Important Contact Information</p> <p>Name of Doctor _____</p> <p>Office Phone _____</p> <p>After-hours Phone _____</p> <p>My Name _____</p> <p>© 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.</p> 